

Precosa®-pakkaukset

-  Precosa® 250 mg 30 kaps. foliopakkaus tai lasipullo
-  Precosa® 250 mg 20 kapselia
-  Precosa® 250 mg 50 kapselia
-  Precosa® 250 mg 10 annosjauhepussia
-  Precosa® 250 mg 20 annosjauhepussia

Helppo annostelu



Precosa® kapseli, 250 mg

Tarvittaessa kapselit voidaan avata ja sisältö sekoittaa pienen määrään ruokaa tai juomaa.



Precosa® annosjauhepussi, 250 mg

Sekoita annosjauhe pienen määrään ruokaa tai juomaa.



PRECOSA.FI



Itsehoitolääke. Ripulin hoito. Antibiooteista aiheutuvan ripulin ehkäisy. Vaikuttava aine *Saccharomyces boulardii*, kanta CNCM I-745. Älä käytä, jos sinulla on hiiva-allergia, keskushäiriöt tai jos olet immuunipuutteinen tai kriittisesti sairas. Tutustu pakkausselosteeseen ja lue annosteluohjeet.

PRECOSA®



RIPULIN HOITOON JA ANTIBIOOTTIRIPULIN EHKÄISYYN

mikrobiston epätasapainoa korjaten



PRECOSA®



Hoida ripuli kokonaisvaltaisesti Precosa® hoitaa ripulia monipuolisesti

- VÄHENTÄÄ ripulin oireita
- HOITAA ripulin syitä (esim. estää salmonellan, e. colin ja muiden taudinaiheuttajien haitallisia vaikutuksia suolen limakalvolla)
- KORJAA suolistomikrobiston epätasapainoa



Precosa® sopii ripulin hoitoon koko perheelle.
Muista Precosa® mukaan matkoille ripulin hoitoon.

Huolehdi suolistosta antibioottikuurin yhteydessä

Suoliston mikrobeilla on tärkeä rooli terveytemme ylläpidossa. Antibiootit tuhoavat taudinaiheuttajien lisäksi myös suoliston omaa mikrobistoa, mikä johtaa mikrobiston epätasapainotilaan (dysbioosi). Toisinaan dysbioosi voi ilmetä ripulina, joka voi alkaa vasta jopa kahdeksan viikkoa antibioottikuurin päättymisen jälkeen¹.

Precosa® ehkäisee antibioottien aiheuttamaa ripulia

- EHKÄISEE ripulia
- KORJAA mikrobiston epätasapainoa (dysbioosia)

**Voit ottaa
samaa aikaan
antibiootin
kanssa**

Käytä Precosaa® antibioottikuurin ajan ja jopa neljä viikkoa kuurin loppumisen jälkeen.